

# ANEURISMAS

Dilatação anormal da parede de uma artéria, que pode provocar rompimento ou gerar coágulo. O aneurisma mais comum ocorre na aorta (maior artéria do corpo) principalmente na parte abdominal (abaixo dos rins). Os aneurismas periféricos ocorrem nas artérias que irrigam as pernas (principalmente na artéria poplítea, que passa atrás do joelho, e na artéria femoral que passa na região da virilha. Também podem aparecer no pescoço, quando acometem a artéria carótida e na artéria que irriga o braço, chamada de artéria subclávia.



Mais comum a partir dos 65 anos. Mais comum entre os homens.



## SINAIS/SINTOMAS:

### ABDOMINAIS:

- Dor abdominal (pode irradiar para as costas)
- Sensação pulsante (abdome)

### TORÁCCICOS:

- Dor torácica

- Tosse forte e rouquidão
- Dificuldade na deglutição

### PERIFÉRICOS:

- Dor
- Formigamento
- Inchaço



## FATORES DE RISCO:

- Hipertensão arterial
- Aterosclerose
- Colesterol
- Tabagismo
- Sedentarismo
- Fatores genéticos



## PREVENÇÃO:

- **CHECKUP VASCULAR**
- Controle da pressão alta
- Controle do colesterol
- Evitar fumar
- Exercícios físicos regulares
- Alimentação saudável



## COMPLICAÇÕES:

### RUPTURA DO ANEURISMA:

- Dores fortes
- Perda dos sentidos
- Pulsação rápida
- Estado de choque
- Morte

**Intervenção cirúrgica necessária para tratar a artéria afetada.**